



¿Qué es la prueba de *VPH*?

El virus del papiloma humano (VPH) genital es el virus de transmisión sexual más común en los Estados Unidos. Se transmite por el contacto genital (por ejemplo, a través de las relaciones sexuales vaginales y anales) y se puede transmitir a otras personas sin saberlo.

La prueba de VPH de iGEN pertenece a un grupo de ensayos de nueva generación por RT-PCR que permite la detección simultánea de VPH-16, VPH-18 y otros genotipos de VPH. De esta manera el médico podrá contar con un estudio que permita distinguir a mujeres con alto riesgo de NIC3+ y disminuir tratamientos invasivos.

¿Quiénes deberían someterse a la prueba de *VPH*?

- Mujeres de 25 a 64 años
- Inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años.
- Antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS).
- Múltiples parejas sexuales (hombre y mujer).
- Pacientes con inmunodeficiencias.
- Mujeres con resultado citológico de lesión intraepitelial o cáncer.

Tipos de prueba de *VPH*

screening



Descripción: Evalúa genotipos de Alto riesgo 16 y 18 y otros genotipos evaluados en pool: 6, 11, 13, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 81, 82, 84, 89, 91.

Tipo de muestra: Exudado Uretral y Vaginal

Tiempo de Respuesta: 3 – 5 días hábiles

HR- Plus



Descripción: Evalúa genotipos individuales de VPH de **alto riesgo** (16, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68-A, 68-B, 70, 73, 82) y genotipos individuales de VPH de **bajo riesgo** (6, 11, 13, 32, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 69, 71, 72, 81, 83, 84, 87, 89, 90)

Tipo de muestra: Tejido, biopsias en FFPE, hisopados cervicales, muestra de citología líquida, exudado vaginal/uretral.

Tiempo de Respuesta: 3 – 5 días hábiles

citología



Descripción: Estudio cito-patológico más eficiente que la citología convencional Papanicolaou

Tipo de muestra: Citología en base líquida tomada con medio Thinprep

Tiempo de Respuesta: 5 -7 días hábiles

