



¿Qué es la prueba de ITS?

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son infecciones que se contagian principalmente a través del contacto sexual. Muchas de ellas no presentan síntomas, por lo que hacerse la prueba es la única forma de detectarlas a tiempo.

La prueba de ITS de iGEN pertenece a un grupo de ensayos por PCR que permite el diagnóstico y el tratamiento temprano y específico de cada ITS. Ayuda a evitar infecciones ascendentes y/o posibles complicaciones futuras no solo en el paciente sino también en la pareja y familia.

¿Quiénes deberían someterse a la prueba de ITS?

- Tamizaje para clamidiasis y gonorrea anualmente a todas las mujeres con vida sexual activa
- Todo paciente VIH positivo de forma anual
- En mujeres embarazadas durante el primer trimestre de gestación.
- Población de alta prevalencia como reclusos o militares.
- Personas que realizan practicas relaciones sexuales de riesgo como lo son el sexo anal receptivo o insertivo, o sexo oral con pareja que tengan lesiones en cavidad oral.

Tipos de prueba de ITS

Basic ITS	Plus ITS	Atypic ITS	Vaginitis ITS
ITS Perfil Básico está indicado para personas que desean monitorear su salud sexual o que presenten síntomas genitales <i>Trichomonas vaginalis,</i> <i>Mycoplasma hominis,</i> <i>Mycoplasma genitalum,</i> <i>Chlamydia trachomatis,</i> <i>Neisseria gonorrhoeae,</i> <i>Ureaplasma urealyticum,</i> <i>Ureaplasma parvum</i> Tipo de muestra: Cepillado uretral o vaginal. Tubo seco con CITOBRUSH Tiempo de Respuesta: 9 días hábiles	ITS Perfil ampliado indicado para personas que quieren monitorear riesgo por exposición sexual en multisitio y/o quienes se vayan a casar o evaluar causas de infertilidad Virus del Papiloma Humano (VPH), Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), <i>Chlamydia trachomatis,</i> <i>Neisseria gonorrhoeae,</i> <i>Mycoplasma genitalum,</i> <i>Mycoplasma hominis,</i> <i>Ureaplasma urealyticum,</i> <i>Ureaplasma parvum,</i> <i>Treponema Pallidum,</i> <i>Trichomonas vaginalis</i> Tipo de muestra: Cepillado uretral o cervicovaginal, exudado faríngeo anal, bucal o biopsia Tiempo de Respuesta 5 días hábiles	Panel para paciente sintomático, más apropiado si alguno de la pareja tiene sospecha de ITS con síntomas atípicos <i>Trichomonas vaginalis,</i> <i>Mycoplasma hominis,</i> <i>Mycoplasma genitalum,</i> <i>Neisseria gonorrhoeae,</i> <i>Ureaplasma urealyticum,</i> <i>Ureaplasma parvum,</i> Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Linfogranuloma venéreo (<i>Chlamydia trachomatis</i> serotipos L1, L2, L3), <i>Treponema Pallidum,</i> <i>Haemophilus ducreyi,</i> Varicela zoster virus (VZV), Citomegalovirus Tipo de muestra: Cepillado uretral o vaginal. Tubo seco con CITOBRUSH Tiempo de Respuesta: 9 días hábiles	Panel para paciente sintomático con diagnóstico diferencial amplio, especialmente las causantes de vaginitis <i>Trichomonas vaginalis,</i> <i>Mycoplasma hominis,</i> <i>Mycoplasma genitalum,</i> <i>Chlamydia trachomatis,</i> <i>Neisseria gonorrhoeae,</i> <i>Ureaplasma urealyticum,</i> <i>Ureaplasma parvum,</i> Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), <i>Gardnarella vaginalis,</i> <i>Candida albicam,</i> <i>Listeria monocytogenes,</i> <i>Streptococcus agalactiae,</i> <i>Treponema pallidum</i> Tipo de muestra: Cepillado uretral, cervical o anal. Medio de transporte de Biología Molecular Tiempo de Respuesta: 4 días hábiles

